

Tisztelt Szülők /Gondviselők/ Tanulók!

Tájékoztatást szeretnénk adni Önöknek arról, hogy a rendészeti iskolákba (rendőr szakközépiskola, Rendőrtiszti Főiskola),milyen egészségi alkalmassági állapotnak kell megfelelni a felvétel során.

Szeretnénk iskolánkban is figyelembe venni a felvételi szempontokat a rendészeti osztályába jelentkezők esetében a pályaorientáció végett.
Elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik Iskolánkban megszerzett érettségi után, a rendőri pályán kívánnak továbbtanulni .
Ezzel az úgynevezett „előszűrésen” lehetőség nyílik arra is, hogy a tanulók már most szembesüljenek azzal, hogy a későbbi továbbtanulás során a rendészeti pályára alkalmasak e egészségileg.

Az egészségi alkalmasságot kizáró leggyakoribb okok:

Az egészségi alkalmasság véleményezése **nem a beiskolázásra való egészségi alkalmasságra irányul**, hanem arra, hogy a megvizsgált személy az iskola elvégzése után, **amennyiben a rendőri pályát kívánja választani** alkalmas lesz-e arra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból s meg fog-e felelni a felvételi követelményeknek.
(Nem vizsgálható, illetve minisíthető az a személy, aki kórházban van; végtagja begipszelt illetve bekötözött.)

*Nőknél 160cm, férfiak esetében 165 cm-nél alacsonyabb a testmagasság.

*Krónikus belgyógyászati megbetegedések (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás, gyomor - nyombélfekély, asthma bronchiale, szívbillentyű anomáliák (elváltozások), szív ingerképzettség és vezetés zavarai stb.); jelentős testsúlytöbblet (testtömeg index számítás alapján: a kilogrammban meghatározott testsúly, osztva a méterben kifejezett testmagasság négyzetével) 25-ig normális, 30 felett alkalmatlanságot jelent.

*Pollenallergia (szénanátha). Pikkelysömör.

*A frontális (elülső) fogak hiánya, szuvasodása (az egészségi vizsgálat előtt a pótlást, illetve a kezelést el kell végeztetni).

*Érzékszervi fogyatékoság: halláscsökkenés, hallószervek krónikus gyulladása, ezek utáni állapota.

*Látáscsökkenés -a nyers látóélesség (szemüveg, kontaktlencse nélkül) 0,3 vagy annál többnek kell lennie; ezen érték alatt alkalmatlan. A két szem között maximum 3,0 D különbség lehet. A látóélességet javító műtét elvégzése után, csak 6 hónap elteltével adható minisítés. (A

műtét előtti korrekciós dioptriaszám nem haladhatja meg a - 4.0 Dioptriát)

*Színtévesztés, színvaktság (Bármilyen mértéke).

*Szemtengely-ferdülés (kancsalság); ennek korrekciós műtét utáni állapota is.

*Korábbi és jelenlegi eszméletvesztéssel járó különböző betegségek. (epilepszia; alkalmi eszméletvesztés)

*Öngyilkossági kísérlet, alkohol, drog és gyógyszerfogyasztás, depressziós, szorongásos kórképek, kezelés utáni állapotok.

*Veszélyes és szerzett belgyógyászati, mozgásszervi, idegrendszeri elváltozások, megbetegedések (pl. a gerincoszlop kóros elváltozásai, láb, kéz, deformitásai; insérülések, térsérülések, csonttörések utáni maradandó elváltozások; fémrögzítéssel történt csonttörések, csak a fémeltávolítás és az átépült csontszerkezet jó funkciója esetén minisítheti stb.).

A fentiekén kívül más megbetegedések és egészségi elváltozások is vannak, amelyek alkalmatlanságot jelentenek

Az egészségi alkalmassági követelményeket a 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tartalmazza részletesen, amely a Magyar Közlöny 2009. évi 153. számában jelent meg.